

- 1. Funkcionalno spirometrijsko ispitivanje**
- 2. Bronhodilatatorni test .** 12 časova pred pregled pacijent ne treba da uzima bronhodilatatore i lijekove u obliku "pumpica".
- 3. Evakuacione i dijagnostičke pleuralne punkcije.** Za ovu intervenciju neophodno je donijeti RTG snimak pluća i propratnu medicinsku dokumentaciju
- 4. Bronhoskopija.** Indikaciju o ovoj vrsti pretrage postavlja specijalista pneumoftziolog našeg odjeljenja. Za ovu vrstu pretrage pacijent treba da ima: RTG snimak pluća u PA poziciji, profilni snimak pluća, laboratorijske nalaze koji uključuju i VK, VZ, KS, SE Trc, EKG, saglasnost interniste o riziku izvođenja bronhoskopije, po potrebi druge specijalističke nalaze i CT grudnog koša.  
12h pred pretragu pacijent ništa ne jede i ne pije. Ukoliko ima hipertenziju, pred polazak samo uzme lijekove za povišen krvni pritisak bez vode.  
Obavezno na pregled doći sa pratnjom.  
2h poslije pregleda ne uzimatimništa od hrane i tečnosti.
- 5. Alegeloško testiranje.** Obavlja se sa standardnim pneumoalergenima kod sumnje na postijanje alergijske bronhijalkne asthme.  
Dvije nedjelje pred pretragu bolesnik ne treba da uzima lijekove iz grupe antihistaminika.  
Tri dana pred pregled bolesnik ne treba d auzima sistemske kortikosteroide.